

Zeitplan, der gefolgt werden muss, um **Megabakterien** bei Vögeln zu behandeln und zu verhindern

Zu berücksichtigen:

- 1.- Sie werden als ein Pilz eingestuft, obwohl es in Form eines sehr großen Bakteriums ist.
- 2.- Sie installieren sich in der Proventriculus der Vögel, verursacht die Nekrose dieser Gewebe und verursacht Durchfall, Anämie und in vielen Fällen den Tod.
- 3.- Es ist sehr häufig, dass Megabakterien mit anderen Krankheiten in Verbindung gebracht werden, die durch Bakterien verursacht werden.
- 4.- Es wird über den Kot übertragen.

Produkte für die Behandlung benötigt:



- **Total Disinfection Solution**, um die Ausbreitung von Keimen durch Wasser zu kontrollieren (einer der wichtigsten Krankheitspfade).



- **Megabac Plus MS**, um die Vermehrung von Megabakterien-Bakterien zu regulieren und zu verhindern.



- **Fungi-Plus MS**, ein starkes Fungizid gegen Megabakterien-Megabakterien.



- **Prowins Probibac Bird**, die perfekte Kombination aus Probiotika, Präbiotika, Elektrolyten, Vitaminen und Aminosäuren, die das ganze Jahr über eine perfekte Darmflora garantiert, auch in Zeiten mit hohem Stress. Speziell für Vögel und Käfigvögel entwickelt

Wochenplan für die Behandlung und Vorbeugung von Megabakterien

Tag	Produkte zu verwenden
Tag 1	Total Disinfection Solution (10 ml pro Liter Trinkwasser) + Megabac Plus (4g pro Liter Trinkwasser)
Tag 2	Megabac Plus (4g pro Liter Trinkwasser) + Fungi-Plus (5ml pro Liter oder 1 kg Eierfutter) + Probibac Bird (1 Esslöffel pro 1 kg Eierfutter)
Tag 3	Megabac Plus (4g pro Liter Trinkwasser) + Fungi-Plus (5ml pro Liter oder 1 kg Eierfutter) + Probibac Bird (1 Esslöffel pro 1 kg Eierfutter)
Tag 4	Total Disinfection Solution (10 ml pro Liter Trinkwasser) + Megabac Plus (4g pro Liter Trinkwasser)
Tag 5	Megabac Plus (4g pro Liter Trinkwasser) + Fungi-Plus (5ml pro Liter oder 1 kg Eierfutter) + Probibac Bird (1 Esslöffel pro 1 kg Eierfutter)
Tag 6	Megabac Plus (4g pro Liter Trinkwasser) + Fungi-Plus (5ml pro Liter oder 1 kg Eierfutter) + Probibac Bird (1 Esslöffel pro 1 kg Eierfutter)
Tag 7	Total Disinfection Solution (10 ml pro Liter Trinkwasser) + Megabac Plus (4g pro Liter Trinkwasser)

✓ Dieser Plan muss während der Brutzeit angewendet werden und endet vor der Mauser.

Megabakterien

