

Esqueme à suivre pour traiter et prévenir les mégabactéries chez les oiseaux

Pour prendre en compte:

- 1.- Ils sont classés comme un champignon, bien qu'il se présente sous la forme d'une très grande bactérie.
- 2.- Ils s'installent dans le proventricule des oiseaux, provoque la nécrose de ces tissus et provoque la diarrhée, l'anémie et dans de nombreux cas la mort.
- 3.- Il est très fréquent que les mégabactéries soient associées à d'autres maladies causées par des bactéries.
- 4.- Il est transféré via les excréments.

Produits nécessaires pour le traitement:



- **Total Disinfection Solution**, pour contrôler la propagation des germes dans l'eau (l'une des voies les plus importantes de la maladie).



- **Megabac Plus MS**, pour réguler et prévenir la prolifération des bactéries associées aux mégabactéries.



- **Fungi-Plus MS**, un puissant fongicide pour lutter contre les mégabactéries.



- **ProWins Probibac Bird**, la combinaison parfaite de probiotiques, prébiotiques, électrolytes, vitamines et acides aminés, qui garantit une flore intestinale parfaite tout au long de l'année, même en période de stress élevé. Développé spécifiquement pour les oiseaux et les oiseaux en cage

Equeme pour le traitement et la prévention des méga-bactéries

Jours	Produits a apliquer
Jour 1	Total Disinfection Solution (10 ml par litre d'eau) + Megabac Plus (4g par litre d'eau)
Jour 2	Megabac Plus (4g par litre d'eau) + Fungi-Plus (5 ml pour 1 L ou 1 kg d'aliment) + Probibac Bird (1 cuillère à soupe pour 1 kg d'aliment)
Jour 3	Megabac Plus (4g par litre d'eau) + Fungi-Plus (5 ml pour 1 L ou 1 kg d'aliment) + Probibac Bird (1 cuillère à soupe pour 1 kg d'aliment)
Jour 4	Total Disinfection Solution (10 ml par litre d'eau) + Megabac Plus (4g par litre d'eau)
Jour 5	Megabac Plus (4g par litre d'eau) + Fungi-Plus (5 ml pour 1 L ou 1 kg d'aliment) + Probibac Bird (1 cuillère à soupe pour 1 kg d'aliment)
Jour 6	Megabac Plus (4g par litre d'eau) + Fungi-Plus (5 ml pour 1 L ou 1 kg d'aliment) + Probibac Bird (1 cuillère à soupe pour 1 kg d'aliment)
Jour 7	Total Disinfection Solution (10 ml par litre d'eau) + Megabac Plus (4g par litre d'eau)



Cette esqueme doit être appliqué tout au long de la saison de reproduction et se termine avant la mue.

Mégabactéries

