

# Programma che deve essere seguito per trattare e prevenire i megabatteri negli uccelli

## Per tenere conto:

- 1.- Sono classificati come funghi, sebbene si tratti di un batterio molto grande.
- 2.- Si installano nel proventricolo degli uccelli, provocano la necrosi di questi tessuti e provocano diarrea, anemia e in molti casi morte.
- 3.- È molto comune che i Megabatteri siano associati ad altre malattie causate da batteri.
- 4.- Viene trasferito tramite gli escrementi.

## Prodotti necessari per il trattamento:



- **Total Disinfection Solution**, per controllare la diffusione di germi attraverso l'acqua (una delle vie più importanti della malattia).



- **Megabac Plus MS**, per regolare e prevenire la proliferazione dei batteri associati ai megabatteri.



- **Fungi-Plus MS**, un potente fungicida per combattere Megabacteria.



- **Prowins Probibac Bird**, la combinazione perfetta di probiotici, prebiotici, elettroliti, vitamine e aminoacidi, che garantisce una perfetta flora intestinale durante tutto l'anno, anche in periodi di forte stress. Sviluppato appositamente per uccelli e uccelli da gabbia

## Programma settimanale per il trattamento e la prevenzione dei mega-batteri

Giorni	i prodotti a usare
1° giorno	<b>Total Disinfection Solution</b> (10 ml per litro di acqua) + <b>Megabac Plus</b> (4g per litro di acqua)
2° giorno	<b>Megabac Plus</b> (4g per litro di acqua) + <b>Fungi-Plus</b> (5ml per 1L o 1kg di cibo) + <b>Probibac Bird</b> (1 cucchiaino per 1 kg di cibo)
3° giorno	<b>Megabac Plus</b> (4g per litro di acqua) + <b>Fungi-Plus</b> (5ml per 1L o 1kg di cibo) + <b>Probibac Bird</b> (1 cucchiaino per 1 kg di cibo)
4° giorno	<b>Total Disinfection Solution</b> (10 ml per litro di acqua) + <b>Megabac Plus</b> (4g per litro di acqua)
5° giorno	<b>Megabac Plus</b> (4g per litro di acqua) + <b>Fungi-Plus</b> (5ml per 1L o 1kg di cibo) + <b>Probibac Bird</b> (1 cucchiaino per 1 kg di cibo)
6° giorno	<b>Megabac Plus</b> (4g per litro di acqua) + <b>Fungi-Plus</b> (5ml per 1L o 1kg di cibo) + <b>Probibac Bird</b> (1 cucchiaino per 1 kg di cibo)
7° giorno	<b>Total Disinfection Solution</b> (10 ml per litro di acqua) + <b>Megabac Plus</b> (4g per litro di acqua)



Questo programma deve essere applicato durante tutta la stagione riproduttiva e termina prima della muta.

## Megabatteri

