

# Zeitplan für die Behandlung und Prävention von Schwarze Punkte bei Vögeln

## Was sollte berücksichtigt werden:

- 1.- Hauptsächlich bei neugeborenen Vögeln (zwischen 1 bis 5 Tage alt), obwohl es auch bei Vögeln von mehreren Monaten alt und sogar bei ausgewachsenen Vögeln vorkommen kann.
- 2.- Hat einen viralen Ursprung und tritt normalerweise in Kombination mit bakteriellen und parasitären Infektionen auf.
- 3.- Es geht von den Eltern an die Nachkommen (während des Wachstums der Jungvögel), über das Trinkwasser und auch durch die Exkrememente.
- 4.- Die Diagnose ist relativ einfach: Man kann einen dunklen Punkt auf der Höhe des Abdomens erkennen, der durch eine Entzündung der Leber und der Milz verursacht wird.

## Produkte, die für die Behandlung notwendig sind:



- **Total Disinfection Solution**, um die Ausbreitung von Keimen durch das Wasser zu kontrollieren (eine der Hauptarten, auf die sich die Keime ausbreiten)



- **Black Spot Plus MS**, um die Vermehrung der mit der Schwarzes Punkt-Krankheit assoziierten Bakterien zu kontrollieren und zu vermeiden.



- **Fungi-Plus MS**, um die Vermehrung der mit der Schwarzes Punkt-Krankheit verbundenen Pilze zu kontrollieren und zu vermeiden.



- **Prowins Probibac Bird**, um die Darmflora zu regenerieren und ihr natürliches Gleichgewicht zu erhalten.

## Wochenplan das zur Behandlung und Vorbeugung der Schwarze Punkten-Krankheit eingehalten werden muss

Tage	Produkte zu verwenden
Tag 1	<b>Total Disinfection Solution</b> (10 ml pro Liter Trinkwasser)
Tag 2	Um das Eifutter hinzuzufügen: (2,5gr <b>Black Spot Plus MS</b> ) + (5ml <b>Fungi-Plus MS</b> ) + (5gr <b>Probibac Bird</b> )
Tag 3	Um das Eifutter hinzuzufügen: (2,5gr <b>Black Spot Plus MS</b> ) + (5ml <b>Fungi-Plus MS</b> ) + (5gr <b>Probibac Bird</b> )
Tag 4	<b>Total Disinfection Solution</b> (10 ml pro Liter Trinkwasser)
Tag 5	Um das Eifutter hinzuzufügen: (2,5gr <b>Black Spot Plus MS</b> ) + (5ml <b>Fungi-Plus MS</b> ) + (5gr <b>Probibac Bird</b> )
Tag 6	Um das Eifutter hinzuzufügen: (2,5gr <b>Black Spot Plus MS</b> ) + (5ml <b>Fungi-Plus MS</b> ) + (5gr <b>Probibac Bird</b> )
Tag 7	<b>Total Disinfection Solution</b> (10 ml pro Liter Trinkwasser)



Dieser Plan muss während der Brutzeit angewendet werden und kann kurz vor der Mauser gestoppt werden.



Wenn dieser Zeitplan eingehalten wird, reduzieren wir die Wahrscheinlichkeit, dass schwarze Punkte auftreten, auf ein Minimum

## Schwarzer Punkt

