

Esqueme à suivre pour le traitement et la prévention des POINTS NOIRS chez les oiseaux

Ce qui devrait être pris en compte:

- 1.- Principalement chez les oiseaux nouveau-nés (âgés de 1 à 5 jours), bien qu'il puisse également se produire chez les oiseaux de plusieurs mois et même chez les oiseaux adultes.
- 2.- A une origine virale et se produit généralement en combinaison avec des infections parasitaires et bactériennes.
- 3.- Il passe des parents à la progéniture (au cours de la croissance des jeunes oiseaux), via l'eau potable et aussi à travers les excréments.
- 4.- Le diagnostic est relativement simple: on peut détecter un point sombre au niveau de l'abdomen, provoqué par une inflammation du foie et de la rate.

Produits nécessaires pour le traitement:



- **Total Disinfection Solution**, pour contrôler la propagation des germes dans l'eau (l'une des principales façons dont les germes se propagent)



- **Black Spot Plus MS**, pour contrôler et éviter la prolifération des bactéries associées à la maladie de Point Noir.



- **Fungi-Plus MS**, pour contrôler et éviter la prolifération des champignons associés à la maladie de Point Noir.



- **Prowins Probibac Bird**, pour régénérer la flore intestinale et maintenir son équilibre naturel.

Esquème qui doit être suivi chaque semaine pour le traitement et la prévention de la maladie des Points Noirs.

Jours	Produits a apliquer
Jour 1	Total Disinfection Solution (10 ml par litre d'eau potable)
Jour 2	Pour ajouter au paté d'œufs: (2,5gr Black Spot Plus MS) + (5ml Fungi-Plus MS) + (5gr Probibac Bird)
Jour 3	Pour ajouter au paté d'œufs: (2,5gr Black Spot Plus MS) + (5ml Fungi-Plus MS) + (5gr Probibac Bird)
Jour 4	Total Disinfection Solution (10 ml par litre d'eau potable)
Jour 5	Pour ajouter au paté d'œufs: (2,5gr Black Spot Plus MS) + (5ml Fungi-Plus MS) + (5gr Probibac Bird)
Jour 6	Pour ajouter au paté d'œufs: (2,5gr Black Spot Plus MS) + (5ml Fungi-Plus MS) + (5gr Probibac Bird)
Jour 7	Total Disinfection Solution (10 ml par litre d'eau potable)



Ce esquème doit être appliqué pendant toute la saison de reproduction et peut être arrêté juste avant la mue.



Si cet esquème est respecté, nous réduirons au minimum les chances d'apparition de points noirs

Point Noir

