

Programma da seguire nel trattamento e prevenzione dei **Punto Neri** negli uccelli

Cosa dovrebbe essere preso in considerazione:

- 1.- Principalmente negli uccelli appena nati (da 1 a 5 giorni), anche se può verificarsi anche negli uccelli di diversi mesi e persino negli uccelli adulti.
- 2.- Ha un'origine virale e di solito si verifica in combinazione con infezioni parassitarie e batteriche.
- 3.- Passa dai genitori alla prole (durante la crescita dei giovani uccelli), attraverso l'acqua potabile e anche attraverso gli escrementi.
- 4.- La diagnosi è relativamente semplice: si può rilevare un punto scuro a livello dell'addome, causato dall'infiammazione del fegato e della milza.

Prodotti necessari per il trattamento:



- **Total Disinfection Solution**, per controllare la diffusione dei germi attraverso l'acqua (uno dei principali modi in cui i germi si diffondono)



- **Black Spot Plus MS**, per controllare ed evitare la proliferazione dei batteri associati alla malattia di Punto Nero.



- **Fungi-Plus MS**, per controllare ed evitare la proliferazione dei funghi associati alla malattia di Punto Nero.



- **Prowins Probibac Bird**, Pro, per rigenerare la flora intestinale e mantenere il suo equilibrio naturale.

Programma da seguire settimanalmente per il trattamento e la prevenzione della malattia di Punti Neri

Giorni	i prodotti a usare
1° giorno	Total Disinfection Solution (10 ml per litro di acqua potabile)
2° giorno	Per aggiungere al pastoncino: (2,5gr Black Spot Plus MS) + (5ml Fungi-Plus MS) + (5gr Probibac Bird)
3° giorno	Per aggiungere al pastoncino: (2,5gr Black Spot Plus MS) + (5ml Fungi-Plus MS) + (5gr Probibac Bird)
4° giorno	Total Disinfection Solution (10 ml per litro di acqua potabile)
5° giorno	Per aggiungere al pastoncino: (2,5gr Black Spot Plus MS) + (5ml Fungi-Plus MS) + (5gr Probibac Bird)
6° giorno	Per aggiungere al pastoncino: (2,5gr Black Spot Plus MS) + (5ml Fungi-Plus MS) + (5gr Probibac Bird)
7° giorno	Total Disinfection Solution (10 ml per litro di acqua potabile)



Questo programma deve essere applicato durante tutta la stagione riproduttiva e può essere fermato appena prima della muta.



Se questo programma viene seguito, ridurremo al minimo la possibilità che appaiano Punti Neri

Punto Nero

