

Behandlung gegen Salmonellose bei Tauben

Zu berücksichtigen:

- 1.- Krankheiten, die bei allen Vogelarten vorkommen, sowohl bei Küken als auch bei Erwachsenen.
- 2.- Tauben, die die Krankheit überleben, können Träger werden.
- 3.- kann in verschiedenen Formen vorliegen: Intestinale (akut grünlich Diarrhoe), Glieder (Erschlaffung Flügel und Beine angehoben), organische (in lebenswichtigen Organen) und Nerven (Gleichgewichtsverlust, Lähmungen, die Drehung des Halses, wie sie auch durch Paramyxovirose verursacht wird).
- 4.- Es verbreitet sich durch Nahrung, Wasser, durch die Luft und durch die Eierschale.

Produkte für die Behandlung benötigt:



- **Total Disinfection Solution**, um die Verbreitung von Keimen zu kontrollieren.



- **Baytril Master Formula**, zur Eliminierung des Erregers der Krankheit (*Salmonella typhimurium*).



- **Probibac Forte**, um die Darmflora zu regenerieren und alle während des Krankheitsprozesses verlorenen Flüssigkeiten zu ersetzen.

Zeitplan für die Behandlung von Salmonellose folgen

Tag	Zu verwendende Produkte:
Tag 1	Total Disinfection Solution (10 ml pro Liter Wasser)
Tag 2	Baytril Master formula (2 ml pro Liter Wasser (40 Tropfen) o 3 direkte Spitzentropfen) + Probibac Forte (1 Esslöffel pro 1 kg Lebensmittel)
Tag 3	Baytril Master formula (2 ml pro Liter Wasser (40 Tropfen) o 3 direkte Spitzentropfen) + Probibac Forte (1 Esslöffel pro 1 kg Lebensmittel)
Tag 4	Total Disinfection Solution (10 ml pro Liter Wasser)
Tag 5	Baytril Master formula (2 ml pro Liter Wasser (40 Tropfen) o 3 direkte Spitzentropfen) + Probibac Forte (1 Esslöffel pro 1 kg Lebensmittel)
Tag 6	Baytril Master formula (2 ml pro Liter Wasser (40 Tropfen) o 3 direkte Spitzentropfen) + Probibac Forte (1 Esslöffel pro 1 kg Lebensmittel)
Tag 7	Total Disinfection Solution (10 ml pro Liter Wasser)
Tag 8	Baytril Master formula (2 ml pro Liter Wasser (40 Tropfen) o 3 direkte Spitzentropfen) + Probibac Forte (1 Esslöffel pro 1 kg Lebensmittel)
Tag 9	Probibac Forte (1 Esslöffel pro 1 kg Lebensmittel)
Tag 10	Probibac Forte (1 Esslöffel pro 1 kg Lebensmittel)



Dieser Zeitplan muss für 10 Tage angewendet werden. Am Ende dieser Periode werden wir aus und wenn sich die +Tauben noch nicht erholt haben, warten wir 4-6 Tage und wiederholen die Behandlung.

Salmonellose

