

Esquema a seguir para tratamiento de **Salmonelosis** en palomas

A tener en cuenta:

- 1.- Enfermedad muy común en todo tipo de aves, que afecta tanto a pichones como a adultos.
- 2.- Las palomas que pasan la enfermedad se pueden convertir en portadores.
- 3.- Se puede presentar de varias formas: Intestinal (diarreas verdosas agudas), articular (alas caídas y patas encogidas), orgánica (afectando a órganos vitales) y nerviosa (pérdida de equilibrio, parálisis, giros del cuello similares a los que provoca la paramyxovirosis)
- 4.- Se propaga a través del alimento, el agua, por vía aérea y a través de la cáscara del huevo.

Productos necesarios para el tratamiento:



- **Total Disinfection Solution**, para controlar la propagación de gérmenes.



- **Baytril Master Formula**, para la eliminación del agente causante de la enfermedad (salmonella typhimurium)



- **Probibac Forte**, para regenerar la flora intestinal y reponer todos los fluídos perdidos durante el proceso de la enfermedad.

Esquema a seguir para el tratamiento de la Salmonelosis

Días	Productos a utilizar
Día 1	Total Disinfection Solution (10 ml por litro de agua)
Día 2	Baytril Master formula (2 ml por litro de agua = 40 gotas ó bien 3 gotas directas al pico) + Probibac Forte (1 cucharada por 1 kg de alimento)
Día 3	Baytril Master formula (2 ml por litro de agua = 40 gotas ó bien 3 gotas directas al pico) + Probibac Forte (1 cucharada por 1 kg de alimento)
Día 4	Total Disinfection Solution (10 ml por litro de agua)
Día 5	Baytril Master formula (2 ml por litro de agua = 40 gotas ó bien 3 gotas directas al pico) + Probibac Forte (1 cucharada por 1 kg de alimento)
Día 6	Baytril Master formula (2 ml por litro de agua = 40 gotas ó bien 3 gotas directas al pico) + Probibac Forte (1 cucharada por 1 kg de alimento)
Día 7	Total Disinfection Solution (10 ml por litro de agua)
Día 8	Baytril Master formula (2 ml por litro de agua = 40 gotas ó bien 3 gotas directas al pico) + Probibac Forte (1 cucharada por 1 kg de alimento)
Día 9	Probibac Forte (1 cucharada por 1 kg de alimento)
Día 10	Probibac Forte (1 cucharada por 1 kg de alimento)



Este esquema debe aplicarse durante 10 días. Al finalizar este periodo, evaluamos y si las palomas todavía no están recuperadas, esperamos 4-6 días y repetimos el tratamiento.

Salmonelosis

