

Traitement de la Salmonellose chez les pigeons

Pour prendre en compte:

- 1.- Maladie commune chez toutes les espèces d'oiseaux, tant chez les poussins que chez les adultes
- 2.- Les pigeons qui survivent à la maladie peuvent devenir porteurs
- 3.- Peuvent être sous différentes formes: Intestinal (de diarrhée verdâtre aiguë), des membres (tombantes ailes et les pattes soulevées), organique (dans les organes vitaux) et des nerfs (perte d'équilibre, une paralysie, la rotation du col comme il est également provoqué par paramyxovirose)
- 4.- Elle se propage à travers la nourriture, l'eau, à travers l'air et à travers la coquille d'oeuf.

Produits nécessaires pour le traitement:



- **Total Disinfection Solution**, pour contrôler la propagation des germes.



- **Baytril Master Formula**, pour l'élimination de l'agent causal de la maladie (salmonella typhimurium)



- **Probibac Forte**, pour régénérer la flore intestinale et remplacer tous les fluides perdus au cours du processus pathologique.

Calendrier à suivre pour le traitement de la Salmonellose

Jours	Produits à utiliser:
Jour 1	Total Disinfection Solution (10 ml par litre d'eau)
Jour 2	Baytril Master formula (2 ml par litre d'eau (40 gouttes) o 3 gouttes de pointe directs) + Probibac Forte (1 cuillère pour 1 kg de nourriture)
Jour 3	Baytril Master formula (2 ml par litre d'eau (40 gouttes) o 3 gouttes de pointe directs) + Probibac Forte (1 cuillère pour 1 kg de nourriture)
Jour 4	Total Disinfection Solution (10 ml par litre d'eau)
Jour 5	Baytril Master formula (2 ml par litre d'eau (40 gouttes) o 3 gouttes de pointe directs) + Probibac Forte (1 cuillère pour 1 kg de nourriture)
Jour 6	Baytril Master formula (2 ml par litre d'eau (40 gouttes) o 3 gouttes de pointe directs) + Probibac Forte (1 cuillère pour 1 kg de nourriture)
Jour 7	Total Disinfection Solution (10 ml par litre d'eau)
Jour 8	Baytril Master formula (2 ml par litre d'eau (40 gouttes) o 3 gouttes de pointe directs) + Probibac Forte (1 cuillère pour 1 kg de nourriture)
Jour 9	Probibac Forte (1 cuillère pour 1 kg de nourriture)
Jour 10	Probibac Forte (1 cuillère pour 1 kg de nourriture)



Ce calendrier doit être appliqué pendant 10 jours. A la fin de cette période nous évaluons et si les pigeons n'ont pas encore récupéré, nous attendons 4-6 jours et répétons le traitement

Salmonellose

