

# Behandlung gegen **Salmonellose** bei Tauben (INDIVIDUELLE BEHANDLUNG)

## Zu berücksichtigen:

- 1.- Krankheiten, die bei allen Vogelarten vorkommen, sowohl bei Küken als auch bei Erwachsenen.
- 2.- Tauben, die die Krankheit überleben, können Träger werden
- 3.- kann in verschiedenen Formen vorliegen: Intestinale (akut grünlich Diarrhoe), Glieder (Erschlaffung Flügel und Beine angehoben), organische (in lebenswichtigen Organen) und Nerven (Gleichgewichtsverlust, Lähmungen, die Drehung des Halses, wie sie auch durch Paramyxovirose verursacht wird).
- 4.- Es verbreitet sich durch Nahrung, Wasser, durch die Luft und durch die Eierschale.

## Produkte für die Behandlung benötigt:



- **Total Disinfection Solution**, um die Verbreitung von Keimen zu kontrollieren.



- **Baytril Master Formula**, um die Ursache der Krankheit (Salmonella Typhimurium) zu beseitigen.



- **Probibac Caps**, um die Darmflora zu regenerieren und alle während des Krankheitsverlaufs verloren gegangenen Flüssigkeiten aufzufüllen

## Zeitplan für die Behandlung von Salmonellose folgen

Tag	Zu verwendende Produkte:
Tag 1	<b>Total Disinfection Solution</b> (10 ml pro Liter Wasser)
Tag 2	<b>Baytril Master formula</b> (3 direkte Spitzentropfen) + <b>Probibac Caps</b> (1 Kapsel pro Taube)
Tag 3	<b>Baytril Master formula</b> (3 direkte Spitzentropfen) + <b>Probibac Caps</b> (1 Kapsel pro Taube)
Tag 4	<b>Total Disinfection Solution</b> (10 ml pro Liter Wasser)
Tag 5	<b>Baytril Master formula</b> (3 direkte Spitzentropfen) + <b>Probibac Caps</b> (1 Kapsel pro Taube)
Tag 6	<b>Baytril Master formula</b> (3 direkte Spitzentropfen) + <b>Probibac Caps</b> (1 Kapsel pro Taube)
Tag 7	<b>Total Disinfection Solution</b> (10 ml pro Liter Wasser)
Tag 8	<b>Baytril Master formula</b> (3 direkte Spitzentropfen) + <b>Probibac Caps</b> (1 Kapsel pro Taube)
Tag 9	<b>Probibac Caps</b> (1 Kapsel pro Taube)
Tag 10	<b>Probibac Caps</b> (1 Kapsel pro Taube)



Dieser Zeitplan muss für 10 Tage angewendet werden. Am Ende dieser Periode werden wir aus und wenn sich die Tauben noch nicht erholt haben, warten wir 4-6 Tage und wiederholen die Behandlung.

## Salmonellose

