

Tratamento Individual das Salmonelas nos Pombos

Informação a ter em Conta:

- 1.- Doença muito comum em todas as Aves, que afecta tanto a Borrachos como Adultos.
- 2.- Os Pombos afectados pela Doença, podem passar facilmente a Portadores.
- 3.- Apresenta-se de múltiplas formas: Intestinal (diarreias verdes e agudas); Articular (asas descaídas e patas encolhidas), Orgânica (afectando Órgãos Vitais) e Nervosa (perca do equilíbrio, paralisias, cabeça revirada, similar ao sintoma provocado pela Paramyxovirose).
- 4.- Propaga-se a través do alimento, água, via aérea ou pela casca dos ovos.

Produtos necessários para o Tratamento:



- **Total Disinfection Solution**, para controlar a propagação dos germens.



- **Baytril Master Formula**, para eliminar o agente que provoca a Doença (salmonella typhimurium).



- **Probibac Caps**, para regenerar a flora intestinal e repor todos os fluídos perdidos durante a Doença.

Método a seguir para o Tratamento da Salmonelosis:

Dias	Produtos necessários
Dia 1	Total Disinfection Solution (10 ml. por litro de água de bebida)
Dia 2	Baytril Master formula (3 gotas diretamente no bico) + Probibac Caps (1 cápsula por pombo)
Dia 3	Baytril Master formula (3 gotas diretamente no bico) + Probibac Caps (1 cápsula por pombo)
Dia 4	Total Disinfection Solution (10 ml. por litro de água de bebida)
Dia 5	Baytril Master formula (3 gotas diretamente no bico) + Probibac Caps (1 cápsula por pombo)
Dia 6	Baytril Master formula (3 gotas diretamente no bico) + Probibac Caps (1 cápsula por pombo)
Dia 7	Total Disinfection Solution (10 ml. por litro de água de bebida)
Dia 8	Baytril Master formula (3 gotas diretamente no bico) + Probibac Caps (1 cápsula por pombo)
Dia 9	Probibac Caps (1 cápsula por pombo)
Dia 10	Probibac Caps (1 cápsula por pombo)



Este Tratamento deve ser aplicado durante 10 dias. Ao finalizar este período, avaliasse a Recuperação dos Pombos e se ainda não estiverem a 100%, suspenda o mesmo, durante 4-6 dias e depois repita novamente o Tratamento.

Salmonelas

