

# Behandeling tegen **Salmonellose** bij duiven

## Om rekening mee te houden:

- 1.- Ziekte die veel voorkomt bij alle soorten vogels, zowel bij kuikens als bij volwassenen.
- 2.- Duiven die de ziekte doorstaan, kunnen drager worden.
- 3.- Kan in verschillende vormen: Intestinale (acute groenachtige diarree), ledematen (hangende vleugels en opgetrokken poten), organische (bij vitale organen) en zenuwen (evenwichtsverlies, verlamming, draaien van de nek zoals die ook veroorzaakt wordt bij paramyxovirose).
- 4.- Het verspreidt zich door voedsel, water, door de lucht en door de eischaal.

## Producten die nodig zijn voor de behandeling:



- **Total Disinfection Solution**, om de verspreiding van ziektekiemen te beheersen.



- **Baytril Master Formula**, voor de eliminatie van de veroorzaker van de ziekte (salmonella typhimurium).



- **Probibac Forte**, om de darmflora te regenereren en alle vloeistoffen die tijdens het ziekteproces verloren zijn gegaan, te vervangen

## Te volgen schema voor de behandeling van salmonellose

Dagen	Producten om te gebruiken
Dag 1	<b>Total Disinfection Solution</b> (10 ml per liter water)
Dag 2	<b>Baytril Master formula</b> (2 ml per liter water (40 druppels) or 3 directe piek druppels) + <b>Probibac Forte</b> (1 eetlepel per 1 kg voer)
Dag 3	<b>Baytril Master formula</b> (2 ml per liter water (40 druppels) or 3 directe piek druppels) + <b>Probibac Forte</b> (1 eetlepel per 1 kg voer)
Dag 4	<b>Total Disinfection Solution</b> (10 ml per liter water)
Dag 5	<b>Baytril Master formula</b> (2 ml per liter water (40 druppels) or 3 directe piek druppels) + <b>Probibac Forte</b> (1 eetlepel per 1 kg voer)
Dag 6	<b>Baytril Master formula</b> (2 ml per liter water (40 druppels) or 3 directe piek druppels) + <b>Probibac Forte</b> (1 eetlepel per 1 kg voer)
Dag 7	<b>Total Disinfection Solution</b> (10 ml per liter water)
Dag 8	<b>Baytril Master formula</b> (2 ml per liter water (40 druppels) or 3 directe piek druppels) + <b>Probibac Forte</b> (1 eetlepel per 1 kg voer)
Dag 9	<b>Probibac Forte</b> (1 eetlepel per 1 kg voer)
Dag 10	<b>Probibac Forte</b> (1 eetlepel per 1 kg voer)



Dit schema moet 10 dagen worden toegepast. Aan het einde van deze periode evalueren we en als de duiven nog niet hersteld zijn, wachten we 4-6 dagen en herhalen we de behandeling.

## Salmonellose

