

Behandlung gegen Salmonellose bei Vögeln

Zu berücksichtigen:

- 1.- Krankheiten, die bei allen Vogelarten vorkommen, sowohl bei Küken als auch bei Erwachsenen.
- 2.- Vögel, die die Krankheit überwinden, können Träger werden.
- 3.- Kann in verschiedenen Formen vorliegen: Intestinale (akut grünlich Diarrhoe), Glieder (Erschlaffung Flügel und Beine angehoben), organische (in lebenswichtigen Organen) und Nerven (Gleichgewichtsverlust, Lähmungen, die Drehung des Halses, wie sie auch durch Paramyxovirose verursacht wird)
- 4.- Es verbreitet sich durch Nahrung, Wasser, durch die Luft und durch die Eierschale.

Produkte für die Behandlung benötigt:



- **Total Disinfection Solution**, um die Verbreitung von Keimen zu kontrollieren.



- **Baytril Master Formula**, um die Ursache der Krankheit (Salmonella Typhimurium) zu beseitigen.



- **Probibac Bird**, um die Darmflora zu regenerieren und alle während des Krankheitsprozesses verlorenen Flüssigkeiten aufzufüllen.

Zeitplan für die Behandlung von Salmonellose folgen

Tage	Zu verwendende Produkte:
Tag 1	Total Disinfection Solution (10 ml pro Liter Wasser)
Tag 2	Baytril Master formula (2 ml pro Liter Wasser = 40 Tropfen) + Probibac Bird (1 Esslöffel pro 1,5 kg Lebensmittel)
Tag 3	Baytril Master formula (2 ml pro Liter Wasser = 40 Tropfen) + Probibac Bird (1 Esslöffel pro 1,5 kg Lebensmittel)
Tag 4	Total Disinfection Solution (10 ml pro Liter Wasser)
Tag 5	Baytril Master formula (2 ml pro Liter Wasser = 40 Tropfen) + Probibac Bird (1 Esslöffel pro 1,5 kg Lebensmittel)
Tag 6	Baytril Master formula (2 ml pro Liter Wasser = 40 Tropfen) + Probibac Bird (1 Esslöffel pro 1,5 kg Lebensmittel)
Tag 7	Total Disinfection Solution (10 ml pro Liter Wasser)
Tag 8	Baytril Master formula (2 ml pro Liter Wasser = 40 Tropfen) + Probibac Bird (1 Esslöffel pro 1,5 kg Lebensmittel)
Tag 9	Probibac Bird (1 Esslöffel pro 1,5 kg Lebensmittel)
Tag 10	Probibac Bird (1 Esslöffel pro 1,5 kg Lebensmittel)



Dieser Zeitplan muss für 10 Tage angewendet werden. Am Ende dieser Periode werden wir aus und wenn die Vögel +noch nicht geborgen sind, warten wir 4-6 Tage und wiederholen die Behandlung.

Salmonellose

