

# Esquema a seguir para tratamiento individual de **Salmonelosis** en pájaros

## A tener en cuenta:

- 1.- Enfermedad muy común en todo tipo de aves, que afecta tanto a pichones como a adultos.
- 2.- Los pájaros que superan la enfermedad se pueden convertir en portadores.
- 3.- Se puede presentar de varias formas: Intestinal (diarreas verdosas agudas), articular (alas caídas y patas encogidas), orgánica (afectando a órganos vitales) y nerviosa (pérdida de equilibrio, parálisis, giros del cuello similares a los que provoca la paramyxovirusis)
- 4.- Se propaga a través del alimento, el agua, por vía aérea y a través de la cáscara del huevo.

## Productos necesarios para el tratamiento:



- **Total Disinfection Solution**, para controlar la propagación de gérmenes.



- **Baytril Master Formula**, para la eliminación del agente causante de la enfermedad (salmonella typhimurium)



- **Probibac Bird**, para regenerar la flora intestinal y reponer todos los fluidos perdidos durante el proceso de la enfermedad.

## Esquema a seguir para el tratamiento de la Salmonelosis

Días	Productos a utilizar
Día 1	<b>Total Disinfection Solution</b> (10 ml por litro de agua)
Día 2	<b>Baytril Master formula</b> (2 ml por litro de agua = 40 gotas) + <b>Probibac Bird</b> (1 cucharada por 1,5 kg de alimento)
Día 3	<b>Baytril Master formula</b> (2 ml por litro de agua = 40 gotas) + <b>Probibac Bird</b> (1 cucharada por 1,5 kg de alimento)
Día 4	<b>Total Disinfection Solution</b> (10 ml por litro de agua)
Día 5	<b>Baytril Master formula</b> (2 ml por litro de agua = 40 gotas) + <b>Probibac Bird</b> (1 cucharada por 1,5 kg de alimento)
Día 6	<b>Baytril Master formula</b> (2 ml por litro de agua = 40 gotas) + <b>Probibac Bird</b> (1 cucharada por 1,5 kg de alimento)
Día 7	<b>Total Disinfection Solution</b> (10 ml por litro de agua)
Día 8	<b>Baytril Master formula</b> (2 ml por litro de agua = 40 gotas) + <b>Probibac Bird</b> (1 cucharada por 1,5 kg de alimento)
Día 9	<b>Probibac Bird</b> (1 cucharada por 1,5 kg de alimento)
Día 10	<b>Probibac Bird</b> (1 cucharada por 1,5 kg de alimento)



Este esquema debe aplicarse durante 10 días. Al finalizar este periodo, evaluamos y si los pájaros todavía no están recuperados, esperamos 4-6 días y repetimos el tratamiento

## **Salmonelosis**

