

Tratamento das Salmonelas nos Pássaros

Informação a ter em Conta:

- 1.- Doença muito comum em todas as aves, que afecta tanto a Borrachos como Adultos.
- 2.- Os Pássaros afectados pela Doença, podem passar facilmente a Portadores.
- 3.- Apresenta-se de múltiplas formas: Intestinal (diarreias verdes e agudas); Articular (asas descaídas e patas encolhidas), Orgânica (afectando Orgãos Vitais) e Nervosa (perca do equilíbrio, paralisias, cabeça revirada, similar ao sintoma provocado pela Paramyxovirosis).
- 4.- Propaga-se a través do alimento, água, via aérea ou pela casca dos ovos.

Produtos necessários para o Tratamento:



- **Total Disinfection Solution**, para controlar a propagação dos germens.



- **Baytril Master Formula**, para eliminar o agente que provoca a Doença (salmonella typhimurium).



- **Probibac Bird**, para regenerar a flora intestinal e repor todos os fluídos perdidos durante a Doença.

Método a seguir para o Tratamento da Salmonelosis:

Dias	Produtos necessários
Dia 1	Total Disinfection Solution (10 ml. por litro de água de bebida)
Dia 2	Baytril Master formula (2 ml. por litro de água de bebida (40 gotas) + Probibac Bird (1 colher por 1,5 kg de alimento)
Dia 3	Baytril Master formula (2 ml. por litro de água de bebida (40 gotas) + Probibac Bird (1 colher por 1,5 kg de alimento)
Dia 4	Total Disinfection Solution (10 ml. por litro de água de bebida)
Dia 5	Baytril Master formula (2 ml. por litro de água de bebida (40 gotas) + Probibac Bird (1 colher por 1,5 kg de alimento)
Dia 6	Baytril Master formula (2 ml. por litro de água de bebida (40 gotas) + Probibac Bird (1 colher por 1,5 kg de alimento)
Dia 7	Total Disinfection Solution (10 ml. por litro de água de bebida)
Dia 8	Baytril Master formula (2 ml. por litro de água de bebida (40 gotas) + Probibac Bird (1 colher por 1,5 kg de alimento)
Dia 9	Probibac Bird (1 colher por 1,5 kg de alimento)
Dia 10	Probibac Bird (1 colher por 1,5 kg de alimento)



Este Tratamento deve ser aplicado durante 10 dias. Ao finalizar este período, avaliasse a Recuperação das Aves e se ainda não estiverem a 100%, suspenda o mesmo, durante 4-6 dias e depois repita novamente o Tratamento.

Salmonelas

