

Behandlung gegen Federmilben bei Tauben

Symptome:

- Sie sind aufgrund ihrer geringen Größe für das menschliche Auge kaum wahrnehmbar.
- Sie verursachen Läsionen im Gefieder, daher werden sie auch "Federfresser" genannt.
- Die Tauben mit dieser Krankheit sind nervös, sie kratzen ununterbrochen, sowohl mit dem Schnabel als auch mit den Beinen
- Auf dem Gefieder erscheinen kahle Stellen, besonders im Bereich der Feldfrucht, die manchmal zu Hautläsionen führen

Produkte für die Behandlung benötigt:



MOXIDECTINE PLUS: Zur Behandlung und Vorbeugung gegen Milben in der Feder oder anderen äußeren Parasiten untergebracht.



NEW AMBUSH: Verbesserte Formel für die Beseitigung von Milben und anderen äußeren Parasiten durch Badewasser.

Schema für die Elimination von Milben folgen

Dagen	Produkte für die Behandlung benötigt:
Dag 1	▶ Wir verwenden Moxidectine Plus (5ml pro Liter Wasser)
Dag 2	▶ Wir verwenden Moxidectine Plus (5ml pro Liter Wasser)
Dag 3	▶ Die Taube baden (Zwangsbad für 2 Minuten) mit New Ambush (1 Esslöffel pro Liter Wasser)
Dag 4	▶ Die Taube baden (Zwangsbad für 2 Minuten) mit New Ambush (1 Esslöffel pro Liter Wasser)
Dag 5	▶ Die Taube baden (Zwangsbad für 2 Minuten) mit New Ambush (1 Esslöffel pro Liter Wasser)
Dag 6	▶ Die Taube baden (Zwangsbad für 2 Minuten) mit New Ambush (1 Esslöffel pro Liter Wasser)
Dag 7	▶ Die Taube baden (Zwangsbad für 2 Minuten) mit New Ambush (1 Esslöffel pro Liter Wasser)
Dag 8	▶ Die Taube baden (Zwangsbad für 2 Minuten) mit New Ambush (1 Esslöffel pro Liter Wasser)
Dag 9	▶ Die Taube baden (Zwangsbad für 2 Minuten) mit New Ambush (1 Esslöffel pro Liter Wasser)

BEHANDLUNG:

- Wir verwenden **Moxidectine Plus** für 2 aufeinanderfolgende Tage (5ml pro Liter Wasser)
- 1 Woche lang jeden Tag die Taube baden (Zwangsbad für 2 Minuten) mit **New Ambush** (1 Esslöffel pro Liter Wasser)

Federmilben

