

Individuelle Behandlung von Kokzidiose bei Tauben

Zu berücksichtigen:

- 1.- Darmerkrankung, die alle Arten von Vögeln betrifft, sowohl bei Küken als auch bei Erwachsenen.
- 2.- Es kann akute und erkennbare Symptome zeigen: wässriger, grünlicher Durchfall, mit schlechtem Geruch und apathischen und sichtbar erkrankten Tauben (akute Entwicklung der Krankheit)
- 3.- Es kann auch sehr milde Symptome, schwer zu diagnostizieren: scheinbar gesunde Taube, mit wenig Vitalität, geringe Leistung auf Flügen und manchmal mit weichen Exkrementen (Asymptomatische Evolution)
- 4.- Manchmal ist es mit Salmonellose, E. coli, Darmwürmer verwechselt.

Notwendige Produkte:



- **Baycox**, für die Kontrolle und Beseitigung von Kokzidiose.



- **Probibac Caps**, um die Darmflora zu regenerieren und die Abwehrkräfte zu stärken.

Schema für die Behandlung von Kokzidiose folgen

Tag	Notwendige Produkte:
Tag 1	- Im Trinkwasser: Baycox (4 ml pro Liter Wasser oder 3 Tropfen direkt ins Bek) - Probibac Caps (1 Kapsel pro Taube)
Tag 2	- Im Trinkwasser: Baycox (4 ml pro Liter Wasser oder 3 Tropfen direkt ins Bek) - Probibac Caps (1 Kapsel pro Taube)
Tag 3	- Im Trinkwasser: Baycox (4 ml pro Liter Wasser oder 3 Tropfen direkt ins Bek) - Probibac Caps (1 Kapsel pro Taube)
Tag 4	- Im Trinkwasser: Baycox (4 ml pro Liter Wasser oder 3 Tropfen direkt ins Bek) - Probibac Caps (1 Kapsel pro Taube)
Tag 5	- Im Trinkwasser: Baycox (4 ml pro Liter Wasser oder 3 Tropfen direkt ins Bek) - Probibac Caps (1 Kapsel pro Taube)



Behandlung für 5 aufeinanderfolgende Tage

Kokzidiose

