

Traitement individuel de la coccidiose chez les pigeons

À prendre en compte:

- 1.- Maladie intestinale qui affecte tous les types d'oiseaux, affectant à la fois les poussins et les adultes.
- 2.- Il peut présenter des symptômes aigus et reconnaissables: diarrhée aqueuse, verdâtre, avec une mauvaise odeur et des pigeons apathiques et visiblement malades (évolution aiguë de la maladie)
- 3.- Il peut aussi présenter des symptômes très légers, difficiles à diagnostiquer: pigeon apparemment sain, peu vital, peu performant lors des vols et parfois avec des excréments mous (évolution asymptomatique)
- 4.- Parfois, il est confondu avec la salmonellose, l'e-coli, les vers intestinaux.

Produits nécessaires:



- **Baycox**, pour le contrôle et l'élimination de la coccidiose.



- **Probibac Caps**, pour régénérer la flore intestinale et renforcer les défenses.

Schéma à suivre pour le traitement de la coccidiose

Jours	Produits nécessaires:
Jour 1	- Dans l'eau potable: Baycox (4 ml par litre d'eau ou 3 gouttes directes dans le bec) - Probibac Caps (1 capsule par pigeon)
Jour 2	- Dans l'eau potable: Baycox (4 ml par litre d'eau ou 3 gouttes directes dans le bec) - Probibac Caps (1 capsule par pigeon)
Jour 3	- Dans l'eau potable: Baycox (4 ml par litre d'eau ou 3 gouttes directes dans le bec) - Probibac Caps (1 capsule par pigeon)
Jour 4	- Dans l'eau potable: Baycox (4 ml par litre d'eau ou 3 gouttes directes dans le bec) - Probibac Caps (1 capsule par pigeon)
Jour 5	- Dans l'eau potable: Baycox (4 ml par litre d'eau ou 3 gouttes directes dans le bec) - Probibac Caps (1 capsule par pigeon)



Traitement pendant 5 jours consécutifs

Coccidiose

