

Trattamento individuale della coccidiosi nei piccioni

Per tenere conto:

- 1.- Malattia intestinale che colpisce tutti i tipi di uccelli, che colpisce sia i pulcini che gli adulti.
- 2.- Può presentare sintomi acuti e riconoscibili: diarrea acquosa, verdastra, con un cattivo odore e piccioni apatici e visibilmente malati (evoluzione acuta della malattia)
- 3.- Può anche presentare sintomi molto lievi, difficili da diagnosticare: piccioni apparentemente sani, con poca vitalità, basse prestazioni sui voli e, a volte, con escrementi morbidi (evoluzione asintomatica)
- 4.- A volte è confuso con salmonellosi, e-coli, vermi intestinali.

Prodotti necessari:



- **Baycox**, per il controllo e l'eliminazione della coccidiosi.



- **Probibac Caps**, per rigenerare la flora intestinale e+ rafforzare le difese.

Schema da seguire per il trattamento della coccidiosi

| Giorni | Prodotti necessari: |
|-----------|--|
| 1° giorno | - Nell'acqua potabile: Baycox (4 ml per litro di acqua o 3 gocce dirette al picco) - Probibac Caps (1 capsula per piccione) |
| 2° giorno | - Nell'acqua potabile: Baycox (4 ml per litro di acqua o 3 gocce dirette al picco) - Probibac Caps (1 capsula per piccione) |
| 3° giorno | - Nell'acqua potabile: Baycox (4 ml per litro di acqua o 3 gocce dirette al picco) - Probibac Caps (1 capsula per piccione) |
| 4° giorno | - Nell'acqua potabile: Baycox (4 ml per litro di acqua o 3 gocce dirette al picco) - Probibac Caps (1 capsula per piccione) |
| 5° giorno | - Nell'acqua potabile: Baycox (4 ml per litro di acqua o 3 gocce dirette al picco) - Probibac Caps (1 capsula per piccione) |



Trattamento per 5 giorni consecutivi

Coccidiosi

