

Individuele behandeling van coccidiose bij duiven

Om rekening mee te houden:

- 1.- Darmziekte die alle soorten vogels, zowel kuikens als volwassenen, treft.
- 2.- Het kan acute en herkenbare symptomen veroorzaken: waterige, groenachtige diarree, met een slechte geur en apathische en zichtbaar zieke duiven (acute evolutie van de ziekte)
- 3.- Het kan ook zeer milde symptomen vertonen, moeilijk te diagnosticeren: ogenschijnlijk gezonde duif, met weinig vitaliteit, lage prestaties op vluchten en soms met zachte uitwerpselen (Asymptomatische evolutie).
- 4.- Soms wordt het verward met salmonellose, e-coli, darmwormen.

Noodzakelijke producten:



- **Baycox**, voor de bestrijding en eliminatie van coccidiose.



- **Probibac Caps**, om de darmflora te regenereren en de afweer te versterken.

Regeling die moet worden gevolgd voor de behandeling van coccidiose

Dagen	Noodzakelijke producten:
Dag 1	- In het drinkwater: Baycox (4 ml per liter water of 3 druppels rechtstreeks in de bek) - Probibac Caps (1 capsule per duif)
Dag 2	- In het drinkwater: Baycox (4 ml per liter water of 3 druppels rechtstreeks in de bek) - Probibac Caps (1 capsule per duif)
Dag 3	- In het drinkwater: Baycox (4 ml per liter water of 3 druppels rechtstreeks in de bek) - Probibac Caps (1 capsule per duif)
Dag 4	- In het drinkwater: Baycox (4 ml per liter water of 3 druppels rechtstreeks in de bek) - Probibac Caps (1 capsule per duif)
Dag 5	- In het drinkwater: Baycox (4 ml per liter water of 3 druppels rechtstreeks in de bek) - Probibac Caps (1 capsule per duif)



Behandeling gedurende 5 opeenvolgende dagen.

Coccidiose

