

Tratamiento contra Coccidiosis en Pájaros

A tener en cuenta:

- 1.- Enfermedad intestinal que afecta a todo tipo de aves, afectando tanto a pichones como a los adultos
- 2.- Puede presentar síntomas agudos y reconocibles: diarrea acuosa, verdosa, con mal olor y palomas apáticas y visiblemente enfermas (Evolución aguda de la enfermedad)
- 3.- También puede presentar síntomas muy leves, difíciles de diagnosticar: pájaro aparentemente sano, con poca vitalidad, bajo rendimiento en los vuelos y, a veces, con excrementos blandos (Evolución asintomática)
- 4.- Algunas veces se confunde con salmonelosis, e-coli, vermes intestinales.

Productos necesarios:



- **ESB4 Plus**, para el control y eliminación de la coccidiosis.



- **Prowins B12 Bird**, para reforzar el sistema inmunológico y potenciar la eficacia de ESB4 Plus



- **Probibac Bird**, para regenerar la flora intestinal.

Esquema a seguir para el tratamiento de Coccidiosis

Días	Productos a utilizar
Día 1	- En el agua de bebida: ESB4 Plus (5gr por litro de agua) + Prowins B12 Bird (15ml por litro de agua) - En la comida: Probibac Bird (7,5g por kilo de alimento)
Día 2	- En el agua de bebida: ESB4 Plus (5gr por litro de agua) + Prowins B12 Bird (15ml por litro de agua) - En la comida: Probibac Bird (7,5g por kilo de alimento)
Día 3	- En el agua de bebida: ESB4 Plus (5gr por litro de agua) + Prowins B12 Bird (15ml por litro de agua) - En la comida: Probibac Bird (7,5g por kilo de alimento)
Día 4	- En el agua de bebida: ESB4 Plus (5gr por litro de agua) + Prowins B12 Bird (15ml por litro de agua) - En la comida: Probibac Bird (7,5g por kilo de alimento)
Día 5	- En el agua de bebida: ESB4 Plus (5gr por litro de agua) + Prowins B12 Bird (15ml por litro de agua) - En la comida: Probibac Bird (7,5g por kilo de alimento)
Día 6	- En el agua de bebida: ESB4 Plus (5gr por litro de agua) + Prowins B12 Bird (15ml por litro de agua) - En la comida: Probibac Bird (7,5g por kilo de alimento)
Día 7	- En el agua de bebida: ESB4 Plus (5gr por litro de agua) + Prowins B12 Bird (15ml por litro de agua) - En la comida: Probibac Bird (7,5g por kilo de alimento)



Este plan debe ser administrado durante 7 días consecutivos.

Coccidiosis

