

Trattamento della coccidiosi negli uccelli

Per tenere conto:

- 1.- Malattia intestinale che colpisce tutti i tipi di uccelli, che colpisce sia i pulcini che gli adulti.
- 2.- Può presentare sintomi acuti e riconoscibili: diarrea acquosa, verdastra, con un cattivo odore e piccioni apatici e visibilmente malati (evoluzione acuta della malattia)
- 3.- Può anche presentare sintomi molto lievi, difficili da diagnosticare: uccelli apparentemente sani, con poca vitalità e, a volte, con escrementi morbidi (evoluzione asintomatica).
- 4.- A volte è confuso con salmonellosi, e-coli, vermi intestinali.

Prodotti necessari:



- **ESB4 Plus**, per il controllo e l'eliminazione della coccidiosi.



- **Prowins B12 Bird**, per rafforzare il sistema immunitario e migliorare l'efficacia di ESB4 Plus.



- **Probibac Bird**, per rigenerare la flora intestinale.

Schema da seguire per il trattamento della Coccidiosi

Giorni	Prodotti necessari:
1° giorno	- Nell'acqua potabile: ESB4 Plus (5gr per litro d'acqua) + Prowins B12 Bird (15ml per litro d'acqua) - Nel cibo: Probibac Bird (7,5 gr per kg di cibo)
2° giorno	- Nell'acqua potabile: ESB4 Plus (5gr per litro d'acqua) + Prowins B12 Bird (15ml per litro d'acqua) - Nel cibo: Probibac Bird (7,5 gr per kg di cibo)
3° giorno	- Nell'acqua potabile: ESB4 Plus (5gr per litro d'acqua) + Prowins B12 Bird (15ml per litro d'acqua) - Nel cibo: Probibac Bird (7,5 gr per kg di cibo)
4° giorno	- Nell'acqua potabile: ESB4 Plus (5gr per litro d'acqua) + Prowins B12 Bird (15ml per litro d'acqua) - Nel cibo: Probibac Bird (7,5 gr per kg di cibo)
5° giorno	- Nell'acqua potabile: ESB4 Plus (5gr per litro d'acqua) + Prowins B12 Bird (15ml per litro d'acqua) - Nel cibo: Probibac Bird (7,5 gr per kg di cibo)
6° giorno	- Nell'acqua potabile: ESB4 Plus (5gr per litro d'acqua) + Prowins B12 Bird (15ml per litro d'acqua) - Nel cibo: Probibac Bird (7,5 gr per kg di cibo)
7° giorno	- Nell'acqua potabile: ESB4 Plus (5gr per litro d'acqua) + Prowins B12 Bird (15ml per litro d'acqua) - Nel cibo: Probibac Bird (7,5 gr per kg di cibo)



Trattamento per 7 giorni consecutivi

Coccidiosi

