

# Trattamento contro ornitosi negli uccelli

## Per tenere conto:

- 1.- Più del 50% dei giovani colombi hanno problemi con l'ornitosi, che causa una diminuzione della forma fisica e perdite elevate nelle competizioni.
- 2.- I sintomi varia: decondizionamento, naso che cola, mancanza di desiderio di volare, le palpebre gonfie, starnuti frequenti, sonaglio e tosse, gola rossa, piume a secco...
- 3.- Si diffonde attraverso l'inalazione della polvere generata dagli escrementi, attraverso l'acqua, il cibo e attraverso l'ingrassamento dei pulcini da parte dei genitori.

## Prodotti necessari:



- **Total Disinfection Solution**, per prevenire la diffusione dell'ornitosi e il contagio ad altri campioni del loft



- **Pantex Ornimix DT**, per il trattamento dell'ornitosi.



- **Probibac Bird**, per rigenerare la flora intestinale e accelerare il recupero

## Schema da seguire per il trattamento di Ornitosis

Giorni	Prodotti necessari:
Giorno 1	- In 1 litro di acqua: <b>Total Disinfection Solution</b> (15 ml) - In 1 kg di pasta: <b>Pantex Ornimix DT</b> (3,5 gr) + <b>Probibac Bird</b> (7,5 gr)
Giorno 2	- In 1 litro di acqua: <b>Total Disinfection Solution</b> (15 ml) - In 1 kg di pasta: <b>Pantex Ornimix DT</b> (3,5 gr) + <b>Probibac Bird</b> (7,5 gr)
Giorno 3	- In 1 litro di acqua: <b>Total Disinfection Solution</b> (15 ml) - In 1 kg di pasta: <b>Pantex Ornimix DT</b> (3,5 gr) + <b>Probibac Bird</b> (7,5 gr)
Giorno 4	- In 1 litro di acqua: <b>Total Disinfection Solution</b> (15 ml) - In 1 kg di pasta: <b>Pantex Ornimix DT</b> (3,5 gr) + <b>Probibac Bird</b> (7,5 gr)
Giorno 5	- In 1 litro di acqua: <b>Total Disinfection Solution</b> (15 ml) - In 1 kg di pasta: <b>Pantex Ornimix DT</b> (3,5 gr) + <b>Probibac Bird</b> (7,5 gr)
Giorno 6	- In 1 litro di acqua: <b>Total Disinfection Solution</b> (15 ml) - In 1 kg di pasta: <b>Pantex Ornimix DT</b> (3,5 gr) + <b>Probibac Bird</b> (7,5 gr)
Giorno 7	- In 1 litro di acqua: <b>Total Disinfection Solution</b> (15 ml) - In 1 kg di pasta: <b>Pantex Ornimix DT</b> (3,5 gr) + <b>Probibac Bird</b> (7,5 gr)



Questo piano deve essere amministrato per 5 giorni consecutivi.

## Ornitosi

