

Behandeling tegen ornithose bij vogels

Om rekening mee te houden:

- 1.- Meer dan 50% van de jonge duiven heeft problemen met ornithose, wat een afname in fysieke vorm en hoge verliezen bij wedstrijden tot gevolg heeft.
- 2.- Zeer gevarieerde symptomen: gebrek aan fysieke conditie, nasale secreties, gebrek aan vlieglust, gezwollen oogleden, veelvuldig niezen, rammelen en hoesten, rode keel, droge veren
- 3.- Het wordt verspreid door de inademing van het stof dat wordt gegenereerd door de uitwerpselen, door het water, voedsel en door het mesten van de kuikens door de ouders

Noodzakelijke producten:



- **Total Disinfection Solution**, om de verspreiding van ornithose en de besmetting van andere exemplaren van het hok te voorkomen



- **Pantex Ornimix DT**, voor de behandeling van ornithose.



- **Probibac Bird**, om de darmflora te regenereren en het herstel te versnellen

Schema für die Behandlung von Ornithose folgen

Dagen	Noodzakelijke producten:
Dag 1	- In een liter water toe: Total Disinfection Solution (15 ml) - In 1kg eivoer: Pantex Ornimix DT (3,5 gr) + Probibac Bird (7,5 gr)
Dag 2	- In een liter water toe: Total Disinfection Solution (15 ml) - In 1kg eivoer: Pantex Ornimix DT (3,5 gr) + Probibac Bird (7,5 gr)
Dag 3	- In een liter water toe: Total Disinfection Solution (15 ml) - In 1kg eivoer: Pantex Ornimix DT (3,5 gr) + Probibac Bird (7,5 gr)
Dag 4	- In een liter water toe: Total Disinfection Solution (15 ml) - In 1kg eivoer: Pantex Ornimix DT (3,5 gr) + Probibac Bird (7,5 gr)
Dag 5	- In een liter water toe: Total Disinfection Solution (15 ml) - In 1kg eivoer: Pantex Ornimix DT (3,5 gr) + Probibac Bird (7,5 gr)
Dag 6	- In een liter water toe: Total Disinfection Solution (15 ml) - In 1kg eivoer: Pantex Ornimix DT (3,5 gr) + Probibac Bird (7,5 gr)
Dag 7	- In een liter water toe: Total Disinfection Solution (15 ml) - In 1kg eivoer: Pantex Ornimix DT (3,5 gr) + Probibac Bird (7,5 gr)



Dieser Plan muss für 7 aufeinanderfolgende Tage verabreicht werden.

Ornithose

