

Tratamiento individual contra Tricomoniasis en Palomas

A tener en cuenta:

- 1.- Enfermedad causada por un flagelado que vive en la mucosa de la garganta y el buche.
- 2.- Es una dolencia universalmente extendida en los palomares de todo el mundo.
- 3.- Es causa de muchas pérdidas y malos resultados en los vuelos.
- 4.- De no ser tratada, puede dar origen a otras enfermedades más graves.
- 5.- La mayoría de las veces se presenta si síntomas apreciables; en algunas ocasiones se aprecian manchas amarillas en la garganta.

Productos necesarios:



- **Total Disinfection Solution**, para evitar la propagación de la enfermedad a otros ejemplares del palomar y evitar la proliferación de otros gérmenes



- **Dac Dazol**, para el control de la tricomoniasis



- **Prowins Probibac Caps**, para reforzar el sistema inmunológico y acelerar la recuperación tras el tratamiento

Esquema a seguir para el tratamiento de Tricomoniasis

Días	Productos a utilizar
Día 1	<u>En 1 litro de agua:</u> 15 ml de Total Disinfection Solution <u>Directo al pico:</u> 1 cápsula de Prowins Probibac Caps + 1 pastilla de Dac Dazol
Día 2	<u>En 1 litro de agua:</u> 15 ml de Total Disinfection Solution <u>Directo al pico:</u> 1 cápsula de Prowins Probibac Caps + 1 pastilla de Dac Dazol
Día 3	<u>En 1 litro de agua:</u> 15 ml de Total Disinfection Solution <u>Directo al pico:</u> 1 cápsula de Prowins Probibac Caps + 1 pastilla de Dac Dazol
Día 4	<u>En 1 litro de agua:</u> 15 ml de Total Disinfection Solution <u>Directo al pico:</u> 1 cápsula de Prowins Probibac Caps + 1 pastilla de Dac Dazol
Día 5	<u>En 1 litro de agua:</u> 15 ml de Total Disinfection Solution <u>Directo al pico:</u> 1 cápsula de Prowins Probibac Caps + 1 pastilla de Dac Dazol
Día 6	<u>En 1 litro de agua:</u> 15 ml de Total Disinfection Solution <u>Directo al pico:</u> 1 cápsula de Prowins Probibac Caps + 1 pastilla de Dac Dazol
Día 7	<u>En 1 litro de agua:</u> 15 ml de Total Disinfection Solution <u>Directo al pico:</u> 1 cápsula de Prowins Probibac Caps + 1 pastilla de Dac Dazol



Este plan debe ser administrado durante 7 días consecutivos.

Tricomoniasis

