

Impfplan für Jungtauben (Absetztauben)

Zu berücksichtigen:

1.- Sobald das Küken entwöhnt ist, warten wir 2 Wochen bevor der Impfplan angewendet wird.

2.- Für entwöhnte Küken: Wir können keine vorbeugende Behandlung verwenden, wenn wir dies tun, werden wir die Bildung des Gefieders beschädigen.

3.- Wenn die Taube nicht in perfektem Zustand ist, warten Sie besser ein paar Tage, bis sie in einwandfreiem Zustand ist.

Produkte für die Behandlung benötigt:



- **Probibac Caps / Probibac Forte**, um das Immunsystem von Küken zu stärken.



- **Prowins Boost-Amin**, um Reaktionen auf den Impfstoff zu vermeiden und sich nach der Impfung gut zu erholen.



Optionen:

- **Salmovac** (Paramyxovirus + Salmonellen + Bronchitis)
- **Adenovac** (Paramyxovirus + Adenovirus)

Zeitplan für die Impfung von Küken nach dem Absetzen

Tag	Produkte zu verwenden
Tag 1	Prowins Probibac Caps (1 Kapsel pro Taube) oder Prowins Probibac Forte (1 Messlöffel pro 1 kg Futter)
Tag 2	Prowins Probibac Caps (1 Kapsel pro Taube) oder Prowins Probibac Forte (1 Messlöffel pro 1 kg Futter)
Tag 3	Prowins Probibac Caps (1 Kapsel pro Taube) oder Prowins Probibac Forte (1 Messlöffel pro 1 kg Futter)
Tag 4	Prowins Probibac Caps (1 Kapsel pro Taube) oder Prowins Probibac Forte (1 Messlöffel pro 1 kg Futter)
Tag 5	Prowins Probibac Caps (1 Kapsel pro Taube) oder Prowins Probibac Forte (1 Messlöffel pro 1 kg Futter)
Tag 6	Impfung mit Salmovac / Adenovac (0,2 ml Sous-Cutanée in der Nuque du Taube)
Tag 7	Prowins Boost-Amin (15 ml pro Liter Trinkwasser)
Tag 8	Prowins Boost-Amin (15 ml pro Liter Trinkwasser)
Tag 9	Prowins Boost-Amin (15 ml pro Liter Trinkwasser)



Dieser Plan muss nach MINDESTENS 2-3 Wochen nach dem Absetzen angewendet werden, solange der Jungvogel in einwandfreiem Zustand ist.

Dauer der Immunität: 12 Monate

