

Método de Vacinação dos Borrachos

Informação a ter em Conta:

1.- Uma vez desmamados os Borrachos; espera-se 2 semanas antes de aplicar o Método de Vacinação.

2.- Aos Borrachos desmamados; NÃO deve ser aplicado nenhum Tratamento Preventivo, se for aplicado irá prejudicar a formação da Plumagem.

3.- Se os Borrachos não estiverem em perfeitas condições, o melhor será esperar uns dias até estarem em perfeitas condições.

Produtos necessários para o Tratamento:



- **Probibac Caps / Probibac Forte**, para fortalecer o Sistema Imunológico dos Borrachos.



- **Prowins Boost-Amin**, para evitar reações a Vacina e recuperar bem após a Vacinação.



Opções:

- **Salmovac**, (Paramyxovirus + Salmonella + Bronquite)

- **Adenovac**, (Paramixovírus + adenovírus)

Esquema a seguir para a Vacinação dos Borrachos, após o Desmame

Dias	Produtos a usar:
Dia 1	Prowins Probibac Caps (1 cápsula por pombo) ou Prowins Probibac Forte (1 colher de medida por 1 kg de alimento)
Dia 2	Prowins Probibac Caps (1 cápsula por pombo) ou Prowins Probibac Forte (1 colher de medida por 1 kg de alimento)
Dia 3	Prowins Probibac Caps (1 cápsula por pombo) ou Prowins Probibac Forte (1 colher de medida por 1 kg de alimento)
Dia 4	Prowins Probibac Caps (1 cápsula por pombo) ou Prowins Probibac Forte (1 colher de medida por 1 kg de alimento)
Dia 5	Prowins Probibac Caps (1 cápsula por pombo) ou Prowins Probibac Forte (1 colher de medida por 1 kg de alimento)
Dia 6	Vacinação com Salmovac o Adenovac (0,2 ml por via subcutânea na nuca do pombo)
Dia 7	Prowins Boost-Amin (15 ml para 1 litro de água)
Dia 8	Prowins Boost-Amin (15 ml para 1 litro de água)
Dia 9	Prowins Boost-Amin (15 ml para 1 litro de água)



Este esquema deve ser aplicado, transcorridas no mínimo 2-3 semanas após o Desmame, sempre que os Borrachos se encontrem em Perfeitas condições.

Duração da imunidade: 12 meses

